

Esta prueba consistirá en la contestación, en el plazo de 150 minutos, de un cuestionario tipo test de 100 preguntas que están relacionadas con el contenido propio de las bases específicas y de 10 preguntas de reserva (a la hora de hacer el examen las preguntas de reserva servirán para sustituir preguntas anuladas, por tanto, es conveniente atenderlas).

Cada pregunta constará de tres respuestas alternativas, siendo únicamente una la correcta. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor asignado a las respuestas correctas.

Superarán esta prueba aquellos aspirantes que hayan obtenido, al menos, el 50 por 100 de la puntuación total del ejercicio. Tendrá carácter eliminatorio.

- 1. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, ¿cuál de las siguientes situaciones constituye una contraindicación absoluta para la realización de una espirometría forzada?**
 - a) Cirugía abdominal reciente
 - b) Problemas bucodentales que dificulten la correcta colocación de la boquilla
 - c) Hemoptisis aguda
- 2. - Según el apartado 3.1.5 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), tras un examen de salud se concluye que un trabajador puede continuar en su puesto, pero debe evitar determinadas tareas concretas debido a una limitación de salud. ¿Qué criterio de valoración corresponde a esta situación?**
 - a) Apto con adaptaciones del puesto de trabajo
 - b) Apto con restricciones laborales
 - c) Apto con recomendaciones
- 3. - Según el artículo 13 del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, ¿cuál es el límite de dosis efectiva para las personas en formación y estudiantes de entre 16 y 18 años que, durante sus estudios, tengan que utilizar fuentes de radiación?**
 - a) 1 mSv por año oficial
 - b) 6 mSv por año oficial
 - c) 20 mSv por año oficial
- 4. - Según la clasificación de Klockhoff modificada recogida en el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica sobre Ruido del Ministerio de Sanidad, ¿qué patrón audiométrico es característico de un escotoma atribuible a la exposición a ruido?**
 - a) Mayor afectación en 3.000 y 4.000 Hz, sin recuperación del umbral en 8.000 Hz
 - b) Mayor afectación en 6.000 y 8.000 Hz, manteniéndose relativamente conservada la frecuencia de 4.000 Hz
 - c) Mayor afectación en 4.000 y/o 6.000 Hz, con recuperación del umbral en 8.000 Hz
- 5. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, en una investigación cuantitativa, ¿en función de qué deben escogerse el tipo de estudio y su diseño?**
 - a) De las técnicas estadísticas disponibles, con independencia de la pregunta de investigación
 - b) De los objetivos propuestos y de la pregunta de investigación
 - c) Del tamaño de la población de referencia, con independencia de los objetivos planteados

- 6. - Según el Tema 13 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), una trabajadora comunica su embarazo al servicio de prevención. Para valorar si existe riesgo laboral para el embarazo, además de conocer la evaluación de riesgos de su puesto, ¿qué actuación resulta necesaria?**
- a) Identificar las condiciones concretas en las que desarrolla su actividad y valorar las características personales de la trabajadora que puedan condicionar su vulnerabilidad
 - b) Aplicar exclusivamente la evaluación de riesgos general del puesto, ya que la situación clínica individual no debe intervenir en la valoración preventiva
 - c) Valorar fundamentalmente la edad gestacional y los antecedentes obstétricos de la trabajadora, utilizando la evaluación general del puesto como referencia suficiente de las condiciones de exposición
- 7. - Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, un trabajador presenta una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Inicialmente puede hablar y toser con fuerza, por lo que se le anima a continuar tosiendo. Minutos después, deja de poder hablar y la tos se vuelve inefectiva, aunque permanece consciente. ¿Cuál es la actuación indicada en ese momento?**
- a) Realizar directamente 5 compresiones abdominales y, si no son efectivas, iniciar RCP
 - b) Inclinarlo hacia delante y realizar 5 golpes interescapulares; si no se resuelve la obstrucción, realizar 5 compresiones abdominales, alternando ambas maniobras
 - c) Continuar estimulando la tos mientras permanezca consciente y reservar los golpes interescapulares y las compresiones abdominales para cuando pierda la consciencia
- 8. - Según el Tema 7 del Manual de Enfermería del Trabajo, relativo a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿cuál de las siguientes situaciones constituye un factor de riesgo relacionado específicamente con la falta de autonomía y control sobre el trabajo?**
- a) La necesidad de mantener niveles elevados de atención y concentración durante períodos prolongados para realizar las tareas asignadas
 - b) La imposibilidad de decidir sobre el orden de las tareas, el método de trabajo o la forma de resolver las incidencias que surgen durante la actividad laboral
 - c) La exigencia de cumplir ritmos de trabajo elevados y plazos estrictos de ejecución, aunque el trabajador pueda organizar por sí mismo la realización de sus tareas
- 9. - Según el artículo 4 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, ¿cuál de las siguientes medidas forma parte de los principios generales para la prevención de los riesgos por agentes químicos?**
- a) Realizar vigilancia de la salud anual a todos los trabajadores que utilicen cualquier agente químico
 - b) Utilizar equipos de protección individual como primera medida preventiva, con independencia de las características de la exposición
 - c) Reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos o que puedan estarlo
- 10. - Según el Anexo III del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, ¿quién debe realizar los trabajos en tensión?**
- a) Cualquier trabajador que haya recibido información general sobre el riesgo eléctrico
 - b) Trabajadores cualificados
 - c) Trabajadores autorizados, aunque no tengan la consideración de trabajadores cualificados

- 11. - Según el artículo 11.2 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido, ¿cuál es la periodicidad mínima establecida para los controles audiométricos?**
- a) Cada tres años en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, y cada cinco años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción
 - b) Cada año en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, y cada tres años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción
 - c) Cada dos años en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, y cada tres años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción
- 12. - Según la NTP 274 del INSST sobre el método del árbol de causas, ¿cuál de las siguientes situaciones constituye una conjunción?**
- a) Un hecho X tiene un único antecedente Y, sin el cual X no se habría producido
 - b) Un hecho X requiere la concurrencia de dos antecedentes Y y Z, independientes entre sí, siendo ambos necesarios para que X se produzca
 - c) Un único antecedente Y da lugar a dos hechos consecuentes X1 y X2 independientes entre sí
- 13. - Según el Tema 13 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), en aplicación del Real Decreto 298/2009, ¿cuál de las siguientes situaciones corresponde a un agente o condición incluido en el anexo VIII para una trabajadora embarazada?**
- a) La manipulación manual de cargas pesadas que pueda suponer un riesgo, especialmente dorsolumbar
 - b) La exposición a ruido cuando, por sus características, pueda influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto
 - c) La exposición al virus de la rubéola cuando no exista prueba de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida frente al agente por su estado de inmunización
- 14. - Según el Tema 3.10 del Manual de Enfermería del Trabajo, durante la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) a la vigilancia de la salud, se identifican varios problemas y necesidades de cuidados en un trabajador. ¿Qué actuación corresponde a la fase de planificación?**
- a) Recoger información sobre los antecedentes de salud del trabajador, sus hábitos y las condiciones de exposición laboral para identificar problemas reales o potenciales
 - b) Establecer un orden de prioridades, definir los objetivos que se pretenden alcanzar y planificar las actuaciones de enfermería adecuadas para abordar los problemas identificados
 - c) Poner en práctica las intervenciones previstas y registrar las actividades realizadas, valorando posteriormente los resultados obtenidos
- 15. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, en un trabajador expuesto de forma habitual a vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, ¿qué alteración vascular se asocia característicamente a este tipo de exposición?**
- a) Eritromelalgia inducida por el aumento mantenido del flujo sanguíneo digital
 - b) Acrocianosis persistente secundaria a insuficiencia arterial estructural
 - c) Fenómeno de Raynaud o dedo blanco inducido por vibración
- 16. - Según el Tema 8.2 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), un trabajador que desarrolla habitualmente su actividad en contacto con aguas residuales consulta en el servicio de prevención sobre la vacunación frente a hepatitis A. ¿Cuál de las siguientes actuaciones se ajusta a lo establecido en el Manual?**
- a) No indicar la vacunación de forma preventiva y reservarla únicamente para después de una exposición accidental identificada a aguas residuales
 - b) Recomendar la vacunación frente a hepatitis A por tratarse de un colectivo con exposición laboral contemplado en el Manual, mediante dos dosis por vía intramuscular separadas por un intervalo de 6 meses
 - c) Recomendar una única dosis de vacuna frente a hepatitis A, reservando la segunda exclusivamente para trabajadores que presenten posteriormente una exposición accidental

- 17. - Según el apartado 5 del Anexo VI del Real Decreto 486/1997, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los locales destinados a primeros auxilios es correcta?**
- a) Son obligatorios únicamente en los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores
 - b) Son obligatorios en los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores y también en los de más de 25 cuando así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo
 - c) Son obligatorios en todos los lugares de trabajo, con independencia del número de trabajadores y de los riesgos existentes
- 18. - De acuerdo con la normativa reguladora de la notificación de accidentes de trabajo mediante el sistema Delt@, ¿cuál es el plazo máximo para tramitar el Parte de Accidente de Trabajo con baja (PAT)?**
- a) Cinco días hábiles desde la fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica
 - b) Veinticuatro horas desde que se produjo cualquier accidente de trabajo, con independencia de su gravedad
 - c) Diez días naturales desde la fecha de la baja médica
- 19. - Según el INSST, desde el punto de vista preventivo, ¿qué caracteriza a los denominados accidentes blancos e incidentes?**
- a) Son sucesos que, sin ocasionar lesiones a las personas trabajadoras, interrumpen la continuidad del trabajo y pueden causar daños materiales o no
 - b) Son accidentes de trabajo que ocasionan lesiones leves, pero no generan incapacidad temporal
 - c) Son accidentes de trabajo que ocasionan una lesión al trabajador, pero no requieren baja médica
- 20. - Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, un trabajador diabético presenta sudoración, temblor y sensación de debilidad. Está consciente, puede tragar con normalidad y refiere que reconoce esos síntomas como una hipoglucemia. ¿Cuál es la actuación inicial más adecuada?**
- a) Administrarle hidratos de carbono de absorción rápida por vía oral y vigilar su evolución, reevaluando posteriormente su estado
 - b) Administrarle un alimento rico en hidratos de carbono de absorción lenta y mantenerlo en reposo hasta comprobar la desaparición de los síntomas
 - c) Administrarle hidratos de carbono de absorción rápida y, una vez ingeridos, indicarle que reanude su actividad si permanece consciente, sin necesidad de nueva valoración
- 21. - Según el artículo 4.2 del Real Decreto 485/1997, ¿qué carácter tiene la señalización de seguridad y salud respecto de las demás medidas preventivas?**
- a) Sustituye a las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva cuando exista señalización suficiente
 - b) No sustituye a las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva ni a la formación e información de los trabajadores, y debe utilizarse cuando aquellas no hayan eliminado o reducido suficientemente los riesgos
 - c) Sustituye a la formación e información de los trabajadores siempre que las señales sean visibles y comprensibles
- 22. - La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 14, regula:**
- a) Vigilancia de la salud
 - b) Información, consulta y participación de los trabajadores
 - c) Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
- 23. - Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, un trabajador sufre una quemadura térmica en la mano y la muñeca por contacto con un líquido caliente. Lleva un reloj y un anillo que no están adheridos a la piel. ¿Cuál es la actuación inicial más adecuada?**
- a) Mantener el reloj y el anillo colocados durante el enfriamiento para evitar manipular la zona lesionada y retirarlos posteriormente si aparece edema
 - b) Enfriar la zona con agua fría corriente y retirar precozmente el reloj y el anillo, siempre que no estén adheridos a la piel ni su retirada requiera maniobras complicadas
 - c) Retirar el reloj y el anillo y aplicar hielo envuelto en una compresa sobre la zona quemada para limitar el edema y la progresión de la lesión

- 24. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, un trabajador expuesto a sílice cristalina respirable presenta una silicosis acelerada. ¿Qué combinación de tiempo de exposición y hallazgos es característica de esta forma clínica?**
- a) Más de 10 años de exposición, nódulos ≤ 10 mm y función pulmonar conservada
 - b) Entre 5 y 10 años de exposición, nódulos y masas de rápida progresión, con deterioro rápido de la función pulmonar
 - c) Menos de 5 años de exposición, patrón acinar bilateral similar a proteinosis alveolar y alteración generalmente restrictiva de la función pulmonar
- 25. - Según el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, un trabajador sufre un golpe de calor como consecuencia de la exposición a elevadas temperaturas durante la realización de su trabajo. ¿Cómo debe calificarse esta contingencia cuando existe relación causal con el trabajo?**
- a) Como enfermedad profesional incluida en el cuadro aprobado por el Real Decreto 1299/2006
 - b) Como accidente de trabajo
 - c) Como enfermedad común, al tratarse de una alteración de la salud producida por un agente ambiental
- 26. - Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, un trabajador sufre un traumatismo craneal tras una caída. Inicialmente está consciente, pero posteriormente presenta somnolencia progresiva y vómitos. ¿Cuál es la actuación más adecuada?**
- a) Considerar los síntomas como signos de alarma, solicitar asistencia sanitaria urgente, mantener la vigilancia del estado de consciencia y evitar movilizaciones innecesarias
 - b) Mantener al trabajador en observación y permitirle dormir, despertándolo periódicamente para comprobar si responde adecuadamente, siempre que no aparezca pérdida completa de consciencia
 - c) Mantenerlo en reposo y realizar controles periódicos de su estado de consciencia, solicitando asistencia sanitaria urgente únicamente si llega a perder la consciencia o presenta un deterioro más acusado
- 27. - Según la NTP 838 del INSST sobre gestión de residuos sanitarios, ¿cuál de los siguientes residuos se incluye entre los residuos sanitarios específicos o de riesgo?**
- a) Material de curas desechable con restos de fluidos corporales
 - b) Guantes desechables utilizados en la asistencia sanitaria
 - c) Material cortante o punzante utilizado en la actividad sanitaria
- 28. - Según el artículo 2 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre agentes químicos, ¿qué se considera un producto intermedio?**
- a) El que permanece al final de la reacción química formando parte del producto final
 - b) El destinado a desaparecer durante la reacción química al transformarse o utilizarse para obtener otra sustancia
 - c) El que constituye el producto final del proceso químico
- 29. - Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, dentro de la cadena de supervivencia del adulto, ¿en qué intervalo debe realizarse la desfibrilación precoz cuando esté indicada?**
- a) Antes de 3-5 minutos desde la parada
 - b) Antes de 5-7 minutos desde la parada
 - c) Antes de 7-9 minutos desde la parada
- 30. - Según la NTP 361 del INSST, relativa a planes de emergencia en lugares de pública concurrencia, ¿con qué periodicidad deben efectuarse los simulacros?**
- a) Al menos una vez al año
 - b) Al menos una vez cada dos años, salvo que se produzcan modificaciones sustanciales en las instalaciones
 - c) Únicamente cuando lo determine la autoridad competente o se produzcan cambios en el plan de emergencia
- 31. - Según la NTP 1211 del INSST, ¿qué expresa el índice de incidencia de accidentes de trabajo?**
- a) El número de accidentes de trabajo por cada 100.000 personas trabajadoras
 - b) El número de accidentes de trabajo por cada millón de horas trabajadas por la población expuesta
 - c) El número de jornadas perdidas por accidentes de trabajo por cada mil horas trabajadas

- 32. .- Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, un trabajador presenta una hemorragia externa en el antebrazo. Tras cubrir la herida y realizar presión directa mantenida, el apósito se empapa de sangre y la hemorragia continúa. ¿Cuál es la actuación correcta?**
- a) Retirar el apósito empapado para localizar nuevamente el punto de sangrado y colocar uno limpio antes de continuar la presión
 - b) Retirar el apósito empapado y realizar compresión manual directa sobre la herida sin interponer nuevas gasas hasta que cese el sangrado
 - c) Mantener el primer apósito, colocar nuevos apósitos encima y continuar ejerciendo presión firme sobre la zona
- 33. .- Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, un trabajador sufre accidentalmente una salpicadura de un producto químico en un ojo. Permanece consciente y presenta dolor e irritación ocular intensa. ¿Cuál debe ser la actuación inicial?**
- a) Irrigar inmediatamente el ojo afectado con abundante agua, mediante un chorro continuo a baja presión, y posteriormente cubrirlo con una gasa estéril y solicitar valoración médica
 - b) Limpiar inicialmente el ojo con una gasa estéril humedecida para retirar los restos visibles del producto y, a continuación, realizar un lavado abundante con agua
 - c) Irrigar inmediatamente el ojo con agua, dirigiendo un chorro a presión sobre la superficie ocular para favorecer la eliminación rápida del producto químico
- 34. .- Según el artículo 102 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, una empresa que colabora voluntariamente en la gestión de las contingencias profesionales respecto de su propio personal puede asumir directamente, a su cargo:**
- a) El pago de las prestaciones por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperación profesional correspondientes
 - b) El pago de las prestaciones por incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional
 - c) El pago de las prestaciones por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional, correspondiendo en todo caso la asistencia sanitaria derivada de dichas contingencias a la entidad gestora o colaboradora
- 35. .- Según el artículo 80 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, respecto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, señala la afirmación INCORRECTA:**
- a) Son entidades gestoras de la Seguridad Social
 - b) Son asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro, cuya finalidad es colaborar en la gestión de la Seguridad Social
 - c) Sus empresarios asociados asumen responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos legalmente
- 36. .- Según la clasificación BIAP recogida en el Manual de Enfermería del Trabajo, ¿qué pérdida auditiva media corresponde a una hipoacusia leve?**
- a) ≤ 20 dB
 - b) 41–70 dB
 - c) 21–40 dB
- 37. .- Según el documento "Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España" (INSST), ¿cuál es la finalidad principal de los Valores Límite Ambientales (VLA)?**
- a) Clasificar la peligrosidad de los agentes químicos
 - b) Servir como referencia para valorar la exposición por inhalación de los trabajadores
 - c) Determinar la concentración ambiental máxima permitida para cualquier contaminante

- 38. .- En el Real Decreto 286/2006, se define que el nivel de exposición diario equivalente a ruido es:**
- a) El nivel de ruido al que está expuesto el trabajador, expresado en decibelios A, en función del tiempo de exposición ponderado a una jornada laboral de 8 horas
 - b) El nivel de ruido al que está expuesto el trabajador, expresado en decibelios B, en función del tiempo de exposición ponderado a una jornada laboral de 8 horas
 - c) El valor de presión sonora al que está expuesto el trabajador, expresado en decibelios A referidos a 20 mPa, en función del tiempo de exposición ponderado a una jornada laboral de 8 horas
- 39. .- Según el Tema 8.2 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), relativo a la profilaxis antitetánica ante heridas, acude al servicio de prevención un trabajador con una herida potencialmente tetanígena. Consta que ha recibido siete dosis de vacuna antitetánica y que han transcurrido más de 10 años desde la última. ¿Cuál es la actuación indicada respecto a la vacunación?**
- a) Administrar necesariamente una dosis de Td, porque toda herida potencialmente tetanígena requiere una dosis de recuerdo cuando han transcurrido más de 10 años
 - b) Valorar la administración de una única dosis adicional de Td en función del tipo de herida
 - c) No administrar vacuna en ningún caso, porque haber recibido cinco o más dosis excluye posteriores dosis de recuerdo antes de los 65 años
- 40. .- Según la clasificación de los agentes biológicos del Real Decreto 664/1997, la Legionella pneumophila es un agente biológico clasificado dentro del:**
- a) Grupo 2
 - b) Grupo 3
 - c) Grupo 4
- 41. .- Según el artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el personal sanitario del Servicio de Prevención deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud y de la evaluación de riesgos con criterios epidemiológicos con la finalidad de:**
- a) Determinar individualmente el origen profesional de cualquier enfermedad diagnosticada en los trabajadores y proceder a su calificación como enfermedad profesional
 - b) Sustituir la evaluación de riesgos cuando los datos de vigilancia de la salud evidencien daños relacionados con una determinada exposición laboral
 - c) Investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud, y proponer medidas para mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
- 42. .- Según el artículo 157 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para que una enfermedad tenga la consideración de enfermedad profesional debe:**
- a) Haber sido contraída como consecuencia del trabajo, aunque la actividad o el agente causante no estén incluidos en el cuadro de enfermedades profesionales
 - b) Haber sido contraída a consecuencia del trabajo en las actividades especificadas en el cuadro de enfermedades profesionales y estar provocada por los elementos o sustancias que en él se indiquen
 - c) Producirse durante el tiempo y en el lugar de trabajo, con independencia de la actividad realizada y del agente que la origine
- 43. .- Según el Real Decreto 74/2001, deberá procederse a la vigilancia médica cuando se esté expuesto a una concentración de plomo en aire que rebase:**
- a) 0,050 mg/m³
 - b) 0,075 mg/m³
 - c) 0,095 mg/m³

- 44. - Según el Tema 8.4 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), una enfermera sufre un pinchazo accidental con una aguja utilizada en un paciente cuya serología muestra HBsAg positivo. La trabajadora completó correctamente la vacunación frente al virus de la hepatitis B y consta documentalmente una respuesta posterior anti-HBs ≥ 10 mUI/ml. ¿Cuál es la actuación indicada respecto a la profilaxis postexposición frente al VHB?**
- a) Administrar una dosis de inmunoglobulina específica antihepatitis B, sin necesidad de administrar nuevas dosis de vacuna
 - b) Administrar una dosis de recuerdo de vacuna frente al VHB y determinar nuevamente los anti-HBs al cabo de 1-2 meses
 - c) No administrar profilaxis postexposición frente al VHB, al tratarse de una trabajadora previamente respondedora y protegida
- 45. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, en relación con la cadena de transmisión de los agentes biológicos, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una vía de transmisión?**
- a) Vía parenteral
 - b) Vía aérea
 - c) Vía digestiva
- 46. - Según el apartado 3 del Anexo VI del Real Decreto 486/1997, ¿cuál de los siguientes elementos forma parte del contenido mínimo del botiquín portátil que debe existir en todo lugar de trabajo?**
- a) Tensiómetro
 - b) Tijeras y pinzas
 - c) Paracetamol
- 47. - Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, ¿qué factores deben valorarse conjuntamente?**
- a) La probabilidad de que se produzca el daño y el número de trabajadores expuestos
 - b) La severidad del daño y la duración de la exposición al riesgo
 - c) La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo
- 48. - Según los conceptos básicos de Toxicología recogidos en el Manual de Higiene Industrial del INSST y en la NTP 108, ¿qué término designa cualquier sustancia ajena al organismo, con independencia de que produzca o no efectos nocivos?**
- a) Xenobiótico
 - b) Tóxico
 - c) Contaminante
- 49. - Según el Tema 13 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), una trabajadora presenta durante el embarazo una patología clínica que hace incompatible la realización de su trabajo, sin que el problema derive de una exposición laboral. ¿Qué actuación debe valorarse?**
- a) La suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, al existir incompatibilidad entre su estado de salud y el trabajo
 - b) El cambio obligatorio a un puesto de trabajo exento de riesgo como paso previo a cualquier otra medida
 - c) La propuesta de una incapacidad temporal por contingencias comunes
- 50. - Según los Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica publicados por el Ministerio de Sanidad, ¿cuál de las siguientes opciones está constituida exclusivamente por riesgos o exposiciones para los que existen dichos protocolos específicos?**
- a) Ruido, trabajos en altura y pantallas de visualización de datos
 - b) Ruido, neuropatías por presión y posturas forzadas
 - c) Ruido, trabajo nocturno y manipulación manual de cargas

- 51. - Según el Tema 13 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), tras aplicar las medidas preventivas previstas en una trabajadora embarazada continúa existiendo un riesgo relacionado con su puesto de trabajo. La adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo permitiría evitar la exposición. ¿Qué actuación corresponde según el procedimiento descrito en el Manual?**
- a) Adaptar las condiciones y/o el tiempo de trabajo, siendo los profesionales sanitarios del servicio de prevención quienes propongan estas medidas
 - b) Trasladar directamente a la trabajadora a uno de los puestos incluidos en la relación de puestos exentos de riesgo, sin intentar previamente la adaptación
 - c) Iniciar la valoración de la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, ya que la persistencia del riesgo tras las medidas preventivas impide mantenerla en su puesto
- 52. - Según el artículo 3 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, ¿qué características definen a un agente biológico del grupo 3?**
- a) Puede causar una enfermedad grave en el ser humano y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz
 - b) Puede causar una enfermedad grave en el ser humano y supone un serio peligro para los trabajadores, pero es poco probable que se propague a la colectividad y existe generalmente profilaxis o tratamiento eficaz
 - c) Puede causar una enfermedad grave en el ser humano y presenta un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente profilaxis o tratamiento eficaz
- 53. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, de acuerdo con la clasificación de la International Agency for Research on Cancer (IARC), ¿cómo se clasifican los agentes incluidos en el Grupo 1?**
- a) Como carcinógenos en humanos
 - b) Como probablemente carcinógenos en humanos
 - c) Como posiblemente carcinógenos en humanos
- 54. - Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, un trabajador presenta una herida en una extremidad con un objeto de tamaño considerable que permanece clavado en ella. No existe una hemorragia externa masiva. ¿Cuál es la actuación más adecuada?**
- a) Extraer cuidadosamente el objeto, evitando movimientos laterales, y realizar posteriormente compresión directa sobre la herida
 - b) Mantener el objeto en su posición, inmovilizarlo para evitar desplazamientos y solicitar asistencia sanitaria
 - c) Extraer el objeto únicamente si puede retirarse con facilidad y, posteriormente, limpiar la herida con agua o suero fisiológico y cubrirla con un apósito estéril
- 55. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, al inicio del curso académico se realiza el seguimiento de 1.000 docentes que no presentan laringitis. Durante los seis meses siguientes aparecen 5 casos nuevos. ¿Qué medida epidemiológica representa la proporción de trabajadores que ha desarrollado la enfermedad durante ese periodo?**
- a) Incidencia acumulada
 - b) Prevalencia
 - c) Densidad o tasa de incidencia
- 56. - Según el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, ¿qué característica presentan las grandes conducciones de distribución?**
- a) Están conectadas radialmente desde una única instalación central
 - b) Son independientes entre sí para evitar incidencias
 - c) Se encuentran enlazadas a modo de anillo

57. **.- Según la NTP 812 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), ante una exposición accidental a material biológico mediante salpicadura en mucosas, ¿cuál es la actuación inmediata indicada?**
- a) Aplicar una solución antiséptica sobre la mucosa y mantenerla durante 5–10 minutos antes de proceder al lavado
 - b) Enjuagar la mucosa con agua abundante o solución salina durante 10–15 minutos, en forma de arrastre
 - c) Lavar la mucosa con agua y jabón durante 10–15 minutos, frotando suavemente para favorecer la eliminación del material biológico
58. **.- Según el artículo 84 del III Convenio colectivo de Canal de Isabel II, cuando un riesgo no pueda evitarse, la actuación preventiva debe consistir en:**
- a) Sustituir inmediatamente el proceso de trabajo
 - b) Evaluar dicho riesgo
 - c) Informar al comité de empresa
59. **.- Según el Real Decreto 39/1997, las empresas con actividades incluidas en el anexo I deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, que se repetirá cada:**
- a) 12 meses
 - b) 2 años
 - c) 4 años
60. **.- Según el Manual de Enfermería del Trabajo, ¿qué diferencia permite distinguir en una espirometría un patrón obstructivo de un patrón no obstructivo?**
- a) En el patrón obstructivo, la relación FEV1/FVC está disminuida; en el patrón no obstructivo, la FVC está disminuida con una relación FEV1/FVC normal
 - b) En ambos patrones, la relación FEV1/FVC está disminuida, diferenciándose únicamente por el valor de la FVC
 - c) En el patrón obstructivo, la relación FEV1/FVC es normal; en el patrón no obstructivo, la relación FEV1/FVC está disminuida
61. **.- Según el Manual de Enfermería del Trabajo, la hipoacusia producida por exposición laboral al ruido se caracteriza principalmente por ser:**
- a) Una hipoacusia de transmisión, debida a alteraciones del oído externo o medio
 - b) Una hipoacusia mixta, con afectación simultánea del oído medio y del oído interno
 - c) Una hipoacusia neurosensorial o de percepción, por afectación coclear del oído interno
62. **.- Según el plan estratégico 2025-2030 de Canal de Isabel II, ¿en qué fase del sistema de abastecimiento se prevé la implantación de sistemas de alerta en puntos críticos?**
- a) Captación
 - b) Tratamiento
 - c) Distribución
63. **.- Según el artículo 89 del III Convenio colectivo de Canal de Isabel II, ¿cuándo procede estudiar la adecuación del puesto de trabajo de una persona trabajadora?**
- a) Cuando exista una incapacidad permanente total reconocida por la Seguridad Social
 - b) Cuando el estado de salud ocasione una reducción de su capacidad de trabajo sin alcanzar una declaración de incapacidad permanente
 - c) Cuando la persona trabajadora solicite un cambio de puesto por motivos personales
64. **.- Según el artículo 102 del III Convenio colectivo de Canal de Isabel II, hacer uso indebido de la información contenida en las bases de datos, incumpliendo lo establecido en la LOPD y demás normativa de aplicación se considera una falta:**
- a) Leve
 - b) Grave
 - c) Muy grave


- 65. - Según el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, ¿cuál es la secuencia correcta de las etapas del ciclo integral del agua, desde la obtención del recurso hasta su posible reutilización?**
- a) Captación → Tratamiento → Distribución → Drenaje urbano → Depuración → Regeneración
 - b) Captación → Tratamiento → Drenaje urbano → Distribución → Depuración → Regeneración
 - c) Captación → Depuración → Tratamiento → Drenaje urbano → Distribución → Regeneración
- 66. - Según el artículo 6 del Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, ¿qué criterio debe aplicarse a la dosis recibida por el paciente en una exploración de radiodiagnóstico?**
- a) Debe mantenerse por debajo de los límites de dosis establecidos para los trabajadores expuestos
 - b) Debe utilizarse siempre la menor dosis técnicamente posible, aunque pueda comprometerse la calidad diagnóstica de la imagen
 - c) Debe mantenerse tan baja como sea razonablemente posible, de forma que pueda obtenerse la información médica requerida
- 67. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, una disminución del nivel plasmático de colinesterasa, aun sin superar el 25 % del rango permitido, obliga a:**
- a) Declarar al trabajador apto sin restricciones
 - b) Considerar un no apto temporal y reevaluar las condiciones de trabajo y los equipos de protección individual
 - c) Repetir únicamente la determinación analítica al año siguiente
- 68. - Según el artículo 88 del III Convenio colectivo de Canal de Isabel II, la gestión de la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional corresponde a:**
- a) La Tesorería General de la Seguridad Social
 - b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
 - c) El servicio médico de empresa
- 69. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, a un trabajador se le realiza una espirometría con prueba broncodilatadora. Tras la administración del broncodilatador, el FEV1 aumenta un 14 % y 250 ml respecto al valor basal. ¿Cómo debe interpretarse este resultado?**
- a) Como una prueba negativa, porque el aumento del FEV1 debe ser igual o superior al 20%
 - b) Como una prueba broncodilatadora positiva
 - c) Como una prueba no valorable, porque la respuesta debe determinarse exclusivamente mediante los cambios de la FVC
- 70. - Según el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos, ¿cuál de los siguientes constituye un efecto biofísico directo no térmico?**
- a) El calentamiento de los tejidos por absorción de energía procedente de campos electromagnéticos
 - b) La interferencia con dispositivos médicos electrónicos implantados, como los marcapasos
 - c) La estimulación de los músculos, los nervios o los órganos sensoriales
- 71. - Según el artículo 4 del Real Decreto 773/1997, ¿cuándo deberán utilizarse los equipos de protección individual (EPI)?**
- a) Siempre que exista cualquier riesgo laboral, con independencia de las medidas de protección colectiva u organizativas adoptadas
 - b) Cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente mediante protección colectiva o medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo
 - c) Únicamente cuando se haya producido previamente un accidente de trabajo relacionado con el riesgo frente al que protege el equipo

- 72. - Según el artículo 84 del III Convenio colectivo de Canal de Isabel II, ¿Con qué periodicidad mínima tiene carácter obligatorio el reconocimiento médico?**
- a) Semestral
 - b) Anual
 - c) Cada dos años
- 73. - Según la NTP 925 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en la exposición simultánea a varios agentes químicos, ¿qué se entiende por aditividad a nivel toxicodinámico?**
- a) El efecto total está compuesto por cada uno de los efectos individuales
 - b) El efecto de un agente se incrementa debido a la presencia de otros agentes
 - c) Los agentes interfieren entre sí provocando una reducción del efecto global
- 74. - Según establece el Real Decreto 486/1997, en los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:**
- a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 17 y 27 °C
 - b) La humedad relativa en los locales donde existan riesgos por electricidad estática el límite inferior será el 30 por 100
 - c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda de 0,25 m/s en ambientes no calurosos
- 75. - Según la NTP 361 del INSST, para que un plan de emergencia sea operativo debe establecer de forma clara, concreta y concisa:**
- a) Exclusivamente los medios materiales disponibles y la relación de servicios externos de emergencia
 - b) Únicamente las funciones del responsable del centro y el procedimiento de evacuación
 - c) Qué se hará, quién lo hará, cuándo, cómo y dónde se hará, planificando la organización humana con los medios necesarios
- 76. - Según el artículo 5 del Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, cuando una gestante se somete a un procedimiento diagnóstico con radiaciones ionizantes que afecta a la región pélvico-abdominal, ¿qué actuación es preceptiva?**
- a) Suspender siempre la exploración hasta después del embarazo, independientemente de su justificación clínica
 - b) Realizar la exploración únicamente si la dosis estimada para el feto es inferior a 1 mSv
 - c) Estimar la dosis en útero y recogerla en un informe dosimétrico que constará en la historia clínica
- 77. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, en relación con los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza mejor a los efectos estocásticos?**
- a) Su aparición depende de que se supere una dosis umbral, y su gravedad aumenta con la dosis recibida
 - b) Son efectos de naturaleza aleatoria y pueden aparecer sin que exista una dosis umbral claramente establecida
 - c) Se producen fundamentalmente tras exposiciones agudas a dosis elevadas y suelen manifestarse de forma precoz
- 78. - Según el Tema 5 del Manual de Enfermería del Trabajo, relativo a la promoción de la salud en el trabajo, ¿cuál de las siguientes intervenciones integra de forma más adecuada el consejo sanitario individual con la promoción de hábitos saludables en el entorno laboral?**
- a) Proporcionar asesoramiento adaptado a las necesidades del trabajador y favorecer condiciones en el entorno laboral que faciliten la adopción de hábitos saludables
 - b) Facilitar recomendaciones sanitarias individualizadas durante los exámenes de salud, considerando que las modificaciones del entorno laboral corresponden exclusivamente a las actuaciones de prevención de riesgos
 - c) Desarrollar actividades informativas sobre hábitos saludables dirigidas al conjunto de la plantilla, reservando el asesoramiento individual para los trabajadores que presenten alteraciones detectadas en la vigilancia de la salud

79. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, durante la realización de una espirometría forzada en un trabajador, ¿cuál de las siguientes actuaciones se ajusta a la técnica recomendada?

- a) Realizar un mínimo de tres maniobras y un máximo de ocho hasta obtener maniobras aceptables y reproducibles
- b) Realizar una única maniobra si el trabajador mantiene la espiración durante al menos seis segundos
- c) Repetir las maniobras tantas veces como sea necesario, sin establecer un número máximo, hasta obtener dos resultados idénticos

80. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, a la vista del siguiente audiograma, ¿qué tipo de alteración auditiva representa mejor el patrón observado?



- a) Una hipoacusia de transmisión
- b) Una hipoacusia neurosensorial
- c) Una audición normal, ya que la pérdida se limita a las frecuencias agudas

81. - Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, durante la RCP de un adulto el DEA analiza el ritmo, indica una descarga y esta se administra. ¿Cuál debe ser la actuación inmediatamente posterior?

- a) Reanudar inmediatamente la RCP, comenzando por las compresiones torácicas, y continuar siguiendo las indicaciones del DEA
- b) Comprobar el pulso carotídeo durante un máximo de 10 segundos antes de decidir si se continúa con la RCP
- c) Valorar nuevamente la respiración durante un máximo de 10 segundos y reiniciar las compresiones únicamente si continúa sin respirar normalmente

- 82. - Según el Tema 7 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), relativo a la gestión del riesgo psicosocial, ¿cuál de las siguientes actuaciones corresponde a un nivel de prevención secundaria?**
- a) Desarrollar programas de reincorporación laboral dirigidos a trabajadores que han sufrido consecuencias sobre su salud por la exposición a factores psicosociales
 - b) Realizar un diagnóstico precoz y proporcionar atención personalizada a trabajadores en los que comienzan a manifestarse problemas de salud relacionados con factores psicosociales
 - c) Reorganizar los horarios y regular la carga de trabajo para eliminar o reducir los factores de riesgo psicosocial antes de que aparezca el daño
- 83. - Según el artículo 2 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, ¿qué se entiende por microorganismo?**
- a) Toda entidad biológica exclusivamente celular, capaz de reproducirse y de transferir material genético
 - b) Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse y de transferir material genético
 - c) Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético
- 84. - Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, un trabajador presenta tras la picadura de un insecto dolor, enrojecimiento y edema limitados a la zona de la picadura, sin otros signos o síntomas. ¿Cuál es la actuación inicial más adecuada?**
- a) Limpiar y desinfectar la zona y aplicar frío local mediante una compresa de agua fría o hielo protegido, evitando su aplicación directa sobre la piel
 - b) Aplicar directamente sobre la zona una pomada antihistamínica y, posteriormente, frío local mediante hielo protegido para reducir el prurito y el edema
 - c) Aplicar hielo directamente sobre la zona durante periodos cortos para reducir rápidamente el dolor y el edema
- 85. - Según los artículos 5 y 6 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido, ¿cuáles son los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, referidos respectivamente al nivel de exposición diaria equivalente ($L_{Aeq,d}$) y al nivel de pico (L_{pico})?**
- a) 85 dB(A) y 140 dB(C), respectivamente
 - b) 80 dB(A) y 135 dB(C), respectivamente
 - c) 90 dB(A) y 145 dB(C), respectivamente
- 86. - Según el Anexo IV del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, sobre protección frente a las radiaciones ionizantes, ¿qué tipo de zona identifica un trébol de color amarillo sobre fondo blanco?**
- a) Zona de permanencia limitada
 - b) Zona de permanencia reglamentada
 - c) Zona de acceso prohibido
- 87. - Según el Anexo I del Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual, ¿en qué categoría se clasifican los EPI destinados a proteger frente a riesgos que pueden tener consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles para la salud?**
- a) Categoría I
 - b) Categoría II
 - c) Categoría III
- 88. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, en la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a plaguicidas, ¿qué determinación forma parte de los controles biológicos y estudios complementarios?**
- a) Determinación de creatinina (CK)
 - b) Determinación rutinaria de troponina I
 - c) Determinación de la colinesterasa plasmática y eritrocitaria

- 89. .- Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, ante una epistaxis espontánea en una persona consciente, ¿cuál es la actuación inicial más adecuada?**
- a) Sentar a la persona con la cabeza ligeramente hacia atrás y comprimir la nariz de forma mantenida para disminuir el sangrado
 - b) Sentar a la persona con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante y comprimir la nariz de forma mantenida durante 10-15 minutos
 - c) Sentar a la persona con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante y realizar compresiones intermitentes de la nariz, liberándola periódicamente para comprobar si ha cesado el sangrado
- 90. .- Según el Manual de Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española, un trabajador presenta una herida superficial contaminada con suciedad visible, sin hemorragia importante. Tras realizar la higiene de manos, ¿cuál es la actuación inicial adecuada para limpiar la herida?**
- a) Lavar la herida con agua y jabón o con suero fisiológico a chorro para arrastrar la suciedad, realizando la limpieza de dentro hacia fuera
 - b) Aplicar directamente povidona yodada sobre la herida, desde el centro hacia los bordes, antes de realizar cualquier lavado
 - c) Limpiar la herida con suero fisiológico desde los bordes hacia el centro y secarla posteriormente mediante frotación con una gasa estéril
- 91. .- Según el Tema 9 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), en la exploración física de un trabajador con sintomatología en muñeca y mano, ¿qué signos se incluyen específicamente en la valoración de esta región?**
- a) Schöber, Lasègue y Bragard
 - b) Phalen, Tinel y Finkelstein
 - c) Lasègue, Finkelstein y Bragard
- 92. .- Según el Manual de Enfermería del Trabajo, ¿cuál de los siguientes instrumentos se utiliza para la evaluación del mobbing o acoso psicológico en el trabajo?**
- a) Cuestionario de Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa (DER)
 - b) Maslach Burnout Inventory (MBI)
 - c) Leymann Inventory of Psychological Terrorization (LIPT)
- 93. .- Quedan excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización:**
- a) Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
 - b) Una pantalla alfanumérica o gráfica considerada pantalla de visualización
 - c) Puesto de trabajo constituido por un equipo con pantalla de visualización, de un teclado, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa, así como el entorno laboral inmediato
- 94. .- Según el Tema 7 del Manual de Enfermería del Trabajo (AET), tras una evaluación de riesgos psicosociales se detectan sobrecarga de trabajo, escasa autonomía y aumento de síntomas de estrés en varios trabajadores. Al elaborar el plan de acción, ¿cuál de las siguientes estrategias se ajusta mejor al enfoque propuesto en el Manual?**
- a) Priorizar la atención individual de los trabajadores que presentan síntomas, dejando las modificaciones organizativas para aquellos casos en los que las medidas individuales resulten insuficientes
 - b) Priorizar medidas colectivas dirigidas a los factores de riesgo identificados y complementarlas, cuando sea necesario, con actuaciones individuales sobre los trabajadores afectados
 - c) Aplicar inicialmente programas individuales de afrontamiento del estrés y, si persisten los síntomas, realizar una nueva evaluación para determinar si es necesario modificar la organización del trabajo

- 95. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, en la evaluación del riesgo biológico, ¿qué diferencia existe entre las actividades con manipulación deliberada de agentes biológicos y aquellas en las que no existe intención deliberada de manipularlos?**
- a) La evaluación es más compleja cuando existe manipulación deliberada, porque se desconoce la identidad de los agentes biológicos utilizados
 - b) La evaluación suele ser más compleja cuando no existe manipulación deliberada, ya que la presencia y exposición a los agentes biológicos puede ser más difícil de determinar
 - c) La evaluación solo es necesaria cuando existe intención deliberada de manipular agentes biológicos
- 96. - Según el artículo 6 del Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, en relación con los niveles de referencia para diagnóstico (NRD), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- a) Deben establecerse y aplicarse en los procedimientos diagnósticos con radiaciones ionizantes y revisarse regularmente
 - b) Constituyen límites de dosis individuales que no pueden superarse en ningún paciente sometido a radiodiagnóstico
 - c) Se aplican exclusivamente a los trabajadores expuestos y permiten determinar su clasificación radiológica
- 97. - De las siguientes actividades laborales en las que se manipulan agentes biológicos ¿En cuál existe intención deliberada en dicha manipulación, según el Real Decreto 664/1997?**
- a) Trabajos en instalaciones depuradoras de agua residual
 - b) Trabajos en laboratorios de diagnóstico microbiológico
 - c) Trabajos en clínica veterinaria
- 98. - Según la clasificación de Klockhoff modificada, recogida en el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica sobre Ruido del Ministerio de Sanidad, ¿qué hallazgo corresponde a un trauma acústico leve?**
- a) Un escotoma inferior a 55 dB, sin pérdida auditiva en el área conversacional
 - b) Un escotoma superior a 55 dB, sin pérdida auditiva en el área conversacional
 - c) Una afectación de todas las frecuencias conversacionales, sin que ninguna supere los 55 dB
- 99. - Según el artículo 4.1 del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, sobre trabajos con riesgo de exposición al amianto, ¿cuál es el valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) que no debe superarse?**
- a) 0,1 fibras/cm³, medidas como media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas
 - b) 0,01 fibras/cm³, medidas como media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas
 - c) 1 fibra/cm³, medida como concentración máxima instantánea durante la jornada
- 100. - Según la normativa de Seguridad Social (TRLGSS) aplicable a los grados de incapacidad permanente, ¿qué se entiende por incapacidad permanente total para la profesión habitual?**
- a) La que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de sus tareas fundamentales
 - b) La que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta
 - c) La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio
- 101. - Según la NTP 442 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), desde una perspectiva preventiva, ¿qué accidentes e incidentes deberían investigarse?**
- a) Todos los accidentes que ocasionen daños a los trabajadores, así como los incidentes que, sin causar lesiones, tengan potencial para producirlas
 - b) Todos los accidentes que ocasionen daños a los trabajadores, sin que sea necesario investigar los incidentes que no causen lesiones
 - c) Únicamente los accidentes graves o mortales y los incidentes con elevada potencialidad lesiva, excluyendo los accidentes leves

- 102. - Según el artículo 15.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál es el primero de los principios generales de la acción preventiva?**
- a) Evitar los riesgos
 - b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
 - c) Combatir los riesgos en su origen
- 103. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, en relación con la exposición laboral a agentes citostáticos, ¿qué vía de penetración adquiere especial importancia tanto en el personal que los prepara como en el que los administra?**
- a) La vía inhalatoria, por la inhalación de aerosoles y microgotas que pueden generarse durante la preparación y administración de los citostáticos
 - b) La vía dérmica, por contacto directo y penetración del medicamento a través de la piel o las mucosas
 - c) La vía parenteral, por pinchazos accidentales o cortes producidos durante la manipulación
- 104. - Según el artículo 12 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido, ¿en qué situación excepcional puede dejar de cumplirse, total o parcialmente, la obligación relativa a la utilización de protectores auditivos individuales?**
- a) Cuando el trabajador manifieste que los protectores auditivos le resultan incómodos durante la realización de su actividad
 - b) Cuando la exposición al ruido tenga una duración limitada dentro de la jornada laboral
 - c) Cuando, debido a la índole del trabajo, la utilización plena y adecuada de los protectores auditivos pueda causar un riesgo mayor para la seguridad o la salud que el hecho de prescindir de ellos
- 105. - Según el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, ¿dónde se realiza el control más exhaustivo, con el mayor número de análisis, dentro del sistema de abastecimiento?**
- a) En las captaciones de agua
 - b) Durante la estancia del agua en la red de distribución
 - c) En las estaciones de vigilancia automática (EVA)
- 106. - Según el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ante un trabajador especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, el empresario deberá:**
- a) Tener en cuenta sus características personales o estado biológico conocido en la evaluación de riesgos y, en función de esta, adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias
 - b) Apartarlo preventivamente de su puesto de trabajo desde que se identifique la especial sensibilidad, con independencia del resultado de la evaluación de riesgos
 - c) Mantenerlo en su puesto habitual siempre que la vigilancia de la salud no haya determinado la existencia de una enfermedad profesional
- 107. - Según el Real Decreto 487/1997, la manipulación manual de una carga NO puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar:**
- a) Cuando la carga es demasiado pesada o grande
 - b) Cuando tiene aristas cortantes
 - c) Cuando es voluminosa o difícil de sujetar
- 108. - Según el Manual de Primeros Auxilios de Cruz Roja Española, en la RCP básica del adulto, ¿qué criterio es suficiente para iniciar las maniobras de reanimación?**
- a) Ausencia de pulso carotídeo
 - b) Ausencia de consciencia y de respiración normal
 - c) Ausencia de consciencia, pulso y respiración
- 109. - Según el Manual de Enfermería del Trabajo, durante el lavado ocular tras una salpicadura por un producto químico, ¿cuál es la posición correcta del ojo lesionado?**
- a) Mantener la cabeza inclinada hacia atrás para favorecer la entrada del líquido de lavado
 - b) Mantener el ojo lesionado hacia abajo, sosteniendo el párpado abierto durante la irrigación
 - c) Mantener la cabeza en posición neutra y alternar el cierre y la apertura del párpado durante el lavado

110. .- Según el artículo 87 del III Convenio colectivo de Canal de Isabel II, ¿Qué órgano participa en el periodo de consultas previo a la aprobación de los puestos susceptibles de uniformidad?

- a)** La comisión paritaria
- b)** La representación sindical más representativa
- c)** Los delegados de prevención en el comité de seguridad y salud